

CLEAR ZONE[®]

FARM FLY SPRAY

KILLS AND REPELS

Flies • Gnats • Mosquitoes

Ants, Carpet Beetles, Centipedes, Cigarette Beetles, Clover Mites, Cluster Flies, Cockroaches, Confused Flour Beetles, Crickets, Deer Flies, Drug-store Beetles, Face Flies, Fleas, Fruit Flies, Gnats, Grain Mites, Granary Weevils, Hornets, Horn Flies, Horse Flies, House Flies, Lice, Millipedes, Mosquitoes, Mud Daubers, Red Flour Beetles, Rice Weevils, Sawtoothed Grain Beetles, Small Flying Moths, Sow Bugs, Spiders, Stable Flies and Wasps

FOR USE IN AND AROUND, BUT NOT LIMITED TO: Dairy Farms (including Milk House, Milk Parlor, Loafing Sheds and Holding Lot), Hog Operations, Horse Stables, Poultry Operations, Beef Cattle Operations, Kennels and Farms, Campgrounds, Catteries and Horse Barns

ACTIVE INGREDIENTS:

Pyrethrins, a botanical insecticide 0.5%
Piperonyl Butoxide, Technical* 4.0%

OTHER INGREDIENTS: 95.5%

*Equivalent to 3.2% (butylcarbityl)(6-propylpiperonyl) ether and 0.8% related compounds

TOTAL: 100.0%

EPA Reg. No. 499-323

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

FIRST AID

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 min. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES: Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 min. Remove contact lenses, if present, after the first 5 min, then continue rinsing eyes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move victim to fresh air. If not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also call 1-800-225-3320 for emergency medical treatment information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through skin. Do not remain in treated area and ventilate the area after treatment is completed. Avoid breathing of vapor. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly after using and before smoking or eating. Do not contaminate water, food or foodstuffs. Remove all pets and birds. Cover fish tanks or remove before spraying.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to fish, birds and other wildlife. Do not apply directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Apply this product only as specified on this label.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Flammable. Contents under pressure. Keep away from heat, sparks and open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. Do not spray on plastic, painted or varnished sur-

faces or directly into any electronic equipment such as radios, televisions, computers, etc.

DIRECTIONS FOR USE

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.

For best results product should be used when can temperature is above 60°F. If temperature is below 60°F, store at room temperature until a temperature of above 60°F is reached.

DAIRY FARM USE: Milking Parlor and Milk Room - Close all windows and doors. Direct fog upward and in all directions at a rate of 1 - 3 sec per 1,000 cu ft. Keep room closed for 15 min after treatment. Open and ventilate before re-occupying. Cover milking utensils and milk to prevent contamination from spray and dead falling insects.

ANIMAL USE (Do not spray sick animals): From approximately a 2 ft distance, thoroughly spray entire animal as it is being released to pasture. Do not spray directly toward animal's eyes. Spot treat withers, shoulders and back where saliva accumulates from head tossing.



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTE: This specimen label is for informational purposes only. All uses may not be approved in all states. See labeling which accompanied product for Directions for Use or call 800-777-8570 for more information. **For automatic specimen label updates, register at www.wmmg.com.**



CLEAR ZONE® Farm Fly Spray

STANCHION BARN USE: Walk behind animals and direct spray over backs allowing 1 sec per animal. For most effective results, apply each morning.

BEEF CATTLE OPERATIONS: In barns, close all windows and doors. Spray at the rate of 1 - 2 sec per 1,000 cu ft. Keep area closed for 15 min following application. Ventilate area after treatment is complete. If area cannot be closed, double the dosage. Repeat application daily or as necessary.

HORSE BARN AND STABLES: Close all windows and doors. Spray at a rate of 1 - 2 sec per 1,000 cu ft. Keep area closed for 15 min following application. Ventilate area after treatment is complete. If area cannot be closed, double the dosage. For animal application, lightly mist over the backs of horses and ponies from a distance of at least 2 ft. Repeat application daily or as necessary.

POULTRY OPERATIONS: Use only in empty poultry houses (when birds are not present). Close all windows and doors. Spray at the rate of 1 - 2 sec per 1,000 cu ft. Keep area closed for 15 min following application. Ventilate area after treatment is complete. If area cannot be closed, double the dosage. Treat daily or as necessary.

HOG OPERATIONS: In hog houses, close all windows and doors. Spray at the rate of 1 - 2 sec per 1,000 cu ft. Keep area closed for 15 min after application. Ventilate the area after treatment is complete. If area cannot be closed, double the dosage. For animal application, direct spray over backs and spray for 1 - 2 sec per hog. Do not spray directly toward animal's face or eyes. Repeat application daily or as necessary.

MUD DAUBER AND WASP NESTS: Spray mist directly on insects and their nests from approximately 2 ft distance. Contacted insects

will fly away from fog. Applications should be made in late evening when insects are at rest. Spray into hiding and breeding places contacting as many insects as possible.

FLEAS: GENERAL VOLUMETRIC TREATMENT: Hold aerosol 36" above floor and direct spray toward floor and lower walls at a rate of 10 sec per 100 sq ft making sure that all floor areas are contacted. Change litter before application. Keep area closed for 15 min. Remove animals before spraying. Open and ventilate before reoccupying. Repeat treatment after 7 days or as necessary.

KENNELS AND CATTERIES: Remove animals before spraying. Ventilate after treatment is complete.

FLYING INSECTS (Cluster Flies, Flies, Fruit Flies, Gnats, Mosquitoes, Small Flying Moths): GENERAL VOLUMETRIC TREATMENT: Close all windows and doors and direct fog upward at a rate of 1 - 3 sec per 1,000 cu ft. Disperse in all locations. Keep area closed for 15 min. Open and ventilate before reoccupying. Repeat treatment as necessary.

FOR EXPOSED ADULT AND LARVAL STAGES OF - Carpet Beetles, Cigarette Beetles, Confused Flour Beetles, Drugstore Beetles, Grain Mites, Granary Weevils, Red Flour Beetles, Rice Weevils and Sawtoothed Grain Beetles: Contact as many insects as possible. Inject into cracks and crevices of pantries, cabinets and other places where insects harbor. Apply around cartons, containers and other areas where these insects tend to congregate. **GENERAL VOLUMETRIC TREATMENT:** Apply 20 sec per 1,000 cu ft of space. Repeat treatment weekly or as insects appear. Infested stored products should be fumigated or

treated by other effective methods using an approved product intended for this purpose.

OUTDOOR GROUND APPLICATION: Flies, Gnats and Mosquitoes in open areas near building and in campgrounds. Best results are obtained when wind speed is 5 mph or less. Apply at a rate of 60 - 80 sec per acre. Spray in wide swaths across area to be treated. Allow spray drift to penetrate dense foliage. Repeat treatment as necessary.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Dispose of container and wastes in accordance with all federal, state and local regulations.

STORAGE: Store in a cool area away from heat or open flame.

PESTICIDE DISPOSAL: Waste resulting from use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE!! Empty container by using the product according to label directions and then offer for recycling, if available. If recycling is not available and if allowed by local ordinances, place container in trash. If container is partly filled, contact your local solid waste agency or call 1-800-CLEANUP (1-800-253-2687) for disposal instructions.

Contains no CFC's or other ozone depleting substances. Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.



A Prescription Treatment® brand insecticide from:

Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
www.wmmg.com

© 2005 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

NOTE: This specimen label is for informational purposes only. All uses may not be approved in all states. See labeling which accompanied product for Directions for Use or call 800-777-8570 for more information. **For automatic specimen label updates, register at www.wmmg.com.**

070522-71

CLEAR ZONE[®]

ASPERSIÓN PARA MOSCAS DE GRANJAS

MATA Y REPELE

Moscas • Moscos • Mosquitos

Hormigas, Escarabajos de alfombras, Cien pies, Escarabajos del Cigarro, Ácaro del trébol, Moscas de enjambre, Cucarachas, Escarabajo Confuso de la Harina, Grillos, Moscas del venado, Escarabajos de farmacia, Pulga de la cara, Pulgas, Moscas de la Fruta, Todo tipo de Mosquitos, Ácaros de los granos, gorgojos de Granero, Avispón, Mosca de los cuernos del ganado vacuno, Pulga de casa, Mosca casera, Liendres, Milpiés, Mosquitos, Escarabajo rojo de la harina, gorgojo del Arroz, Pequeñas palomillas voladoras, Chinchas, Arañas, Moscas de Establo y avispas

PARA USO EN Y ALREDEDOR DE, AUNQUE NO LIMITADO A: Granjas productoras de Leche, (incluyendo establos de ordeña, jaulas de periquitos, etc.), establos de caballos, Instalaciones de ganado, granjas de pollos, Cercas de ganado, cercas de caballerizas, granjas, etc.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piretrinas, *Insecticida botánico* 0.5%
Butoxide de Piperonilo, Técnico* 4.0%

OTROS INGREDIENTES: 95.5%

*Equivalente a 3.2% (butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) éter y 0.80% de compuestos relacionados

TOTAL: 100.0%

EPA Reg. No. 499-323

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

SI ES INGERIDO: Llame un Centro de Control de Venenos o doctor inmediatamente para asistencia en el tratamiento. Proporcione un sorbo de agua a la persona si puede ingerir. No induzca el vomito a menos que lo indique así el Centro de control de envenenamientos o el doctor. No dé nada por boca a una persona inconsciente.

SI CAE EN PIEL O ROPA: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15 - 20 min. Llame un Centro de Control de Envenenamientos o doctor para asistencia en el tratamiento.

SI CAE EN OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague despacio y suavemente con agua por 15 - 20 min. Remueva los lentes del contacto, si están presentes después de los primeros 5 min. entonces continúe enjuagando los ojos. Llame un Centro de Control de Envenenamientos o doctor para asistencia en el tratamiento.

SI ES INHALADO: Mueva a la persona al aire fresco. Si no respira adecuadamente, llame al 911 o una ambulancia, entonces dé respiración artificial, preferentemente por boca a boca, Si posible. Llame un Centro de Control de Envenenamientos o doctor para asistencia en el tratamiento completo. Tenga el recipiente del producto o etiqueta con usted al llamar a un Centro de Control de Envenenamientos o doctor o cuando busque asistencia médica. Usted también puede llamar 1-800-225-3320 para información en emergencias de tratamiento médico.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN RIESGOSO A HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Dañino si es ingerido o se absorbió a través de la piel. No permanezca en áreas tratadas y ventile el área después de que el tratamiento se terminó. Evite respirar de vapor. Evite contacto con piel, ojos o ropa. Lávese completamente después de usar el producto y antes de fumar o comer. No contamine agua, comida o comestibles. Quite todos los animales domésticos y pájaros. Cubra los tanques para peces o remueve estos antes de asperjar.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Este producto es tóxico a peces, pájaros y fauna silvestre. No aplique directamente al agua o en áreas donde el agua está presente o a las áreas donde en agua llega con la marea. Aplique este producto sólo como se especifica en esta etiqueta.

RIESGOS FISICOS QUIMICO

Inflamable. Contenido bajo presión. Manténgase lejos del calor, chispas y llama abierta. No perforo o incinere el recipiente. La exposición a temperaturas arriba de 130 °F puede causar explosión. No rocíe en plástico, superficies pintadas o barnizadas o directa-

mente dentro de cualquier equipo electrónico como radios, televisiones, computadoras, etc.

DIRECCIONES DE USO

ES UNA VIOLACION A LA LEY FEDERAL EL USAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA DIFERENTE A LA INDICADA EN ESTA ETIQUETA.

Para lograr que el producto logre los mejores resultados debe usarse cuando la temperatura sea arriba de los 60 °F. Si la temperatura está debajo de 60 °F, guarde a temperatura del cuarto y espere hasta que se alcance una temperatura de 60 °F.

USO EN GRANJAS LECHERAS: Lugares de ordeña y Cuartos de Leche.-Cierre todas las ventanas y puertas. Dirija el rocío hacia arriba y en todas direcciones a una velocidad de 1-3 segundos por cada 1,000 pies cúbicos. Conserve el cuarto cerrado por 15 minutos después del tratamiento. Abra y ventile antes del reocupar. Cubra los utensilios de ordeña y la leche para evitar contaminación del rocío e insectos que caen muertos.

USO ANIMAL (no rocíe animales enfermos): Desde aproximadamente 2 pies de distancia, rocíe el animal entero cuando esté soltándose para pastar. No rocíe directamente hacia los ojos de animal. Aplique en manchas, sobre hombros y atrás donde la saliva se acumula al lamerse.



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTA: Esta muestra de etiqueta es solo para propósitos informativos. Para las instrucciones de uso, vea la etiqueta adherida al envase del producto o llame al teléfono 800-777-8570 para mayor información. **Para la etiqueta automática de la espécimen actualiza, el registro en www.wmmg.com.**



CLEAR ZONE® Aspersión Para Moscas de Granjas

ESPACIOS EXTERNOS PARA GANADO: Camine detrás de los animales y rocíe directamente sobre su parte trasera durante 1 segundo por el animal. Para resultados mas efectivos, aplique cada mañana.

INSTALACIONES FUNCIONANDO DE GANADO PARA CARNE: En graneros, cierre todas las ventanas y puertas. Rocíe de 1 a 2 segundos por cada 1,000 pies cúbicos. Conserve el área cerrada para 15 minutos después de la aplicación. Ventile área después de que el tratamiento termine. Si el área no puede cerrarse, duplique la dosis. Repita aplicación diariamente o como necesario.

CABALLERIZAS Y ESTABLOS: Cierre todas las ventanas y puertas. Rocíe a una velocidad de 1 - 2 segundos por cada 1,000 pies cúbicos. Conserve el área tratada cerrada por 15 minutos después de la aplicación. Ventile el área después de que el tratamiento termine. Si el área no puede cerrarse, duplique la dosis. Para la aplicación sobre animales, ligeramente rocíe encima de la parte trasera de caballos y potros desde una distancia de por lo menos 2 pies. Repita la aplicación diariamente o como necesario.

GALLINEROS EN FUNCIONAMIENTO: Sólo use en gallineros vacíos (cuando las aves no están presentes). Cierre todas las ventanas y puertas. Rocíe a una dosis de 1 a 2 segundos por cada 1,000 pies cúbicos. Mantenga el área cerrada por 15 minutos después de la aplicación. Ventile área después de que termine el tratamiento. Si el área no puede cerrarse, duplique la dosis. Trate diariamente o como necesario.

PORQUERIZAS FUNCIONANDO: En las porquerizas, cierre todas las ventanas y puertas. Rocíe a dosis de 1 a 2 segundos por cada 1,000 pies cúbicos. Mantenga el área cerrada por 15 minutos después de la aplicación. Ventile el área después de que el tratamiento termine. Si el área no puede cerrarse, duplique la dosis. Para la aplicación animal, rocíe directamente o en la parte trasera por 1-2 segundos por el cerdo. No rocíe directamente hacia la cara u ojos de animal. Repita la aplicación diariamente o como necesario.

PANALES Y NIDOS DE AVISPAS: Asperje directamente sobre los insectos y sus nidos de una distancia aproximada de 2 pies. Los insectos asperjados volarán

lejos de niebla. Deben hacerse aplicaciones por la tarde cuando los insectos están en reposo. Rocíe dentro de lugares escondidos y aquellos donde engendran. Rocíe tantos insectos como sea posible.

PULGAS: TRATAMIENTO VOLUMETRICO GENERAL: Sostenga aerosol a 36 pulgadas sobre el suelo y dirija el rocío hacia el suelo y partes bajas de las paredes a una velocidad de 10 segundos por cada 100 pies cuadrados. Asegurándose que todas las áreas del suelo sean tratadas. Quite la basura antes de la aplicación. Conserve el área cerrada por 15 min. Remueva los animales antes de rociar. Abra y ventile antes de reocupar. Repita el tratamiento después de 7 días o como necesario.

CASAS DE PERROS Y DE GATOS: Remueva a los animales antes de rociar. Ventile después de que el tratamiento se complete.

INSECTOS VOLADORES (Moscas de enjambre, moscas, moscas de fruta, mosquitos, palomillas voladoras pequeñas): TRATAMIENTO VOLUMETRICO GENERAL: Cierre todas las ventanas y puertas y dirija la nebulización hacia arriba a una velocidad de 1-3 segundos por cada 1,000 pies cúbicos. Disperse en todas los lugares. Conserve el área cerrada por 15 min. Abra y ventile antes del reocupar. Repita tratamiento como sea necesario.

PARA ADULTOS EXPUESTOS Y ESTADOS LARVALES DE - Escarabajos de la alfombra, escarabajos del cigarro, escarabajo confuso de la harina, escarabajo de la farmacia, ácaros de los granos, escarabajo rojo de la harina, escarabajo del arroz y escarabajo del Grano: Procure que el producto caiga sobre tantos insectos como posible. Inyecte dentro de huecos y hendiduras de despensas, armarios y otros lugares donde los insectos puedan habitar. Aplique alrededor de cajas de cartón y otras áreas donde estos insectos tienden a congregarse. **TRATAMIENTO VOLUMETRICO GENERAL:** Aplique 20 segundos por cada 1,000 pies cúbicos de espacio. Repita tratamiento semanalmente o cuando los insectos aparecen. Deben fumigarse productos infestados o deben ser tratados por

otros métodos eficaces usando un producto aceptado para este propósito.

APLICACIONES TERRESTRES EN EXTERIORES: Moscas, moscos y mosquitos en áreas abiertas aledañas a edificios y en lugares para acampar. Los mejores resultados se obtienen cuando la velocidad del viento es 5 mph. o menor. Aplique a una velocidad de 60 - 80 segundos por el acre. Aplique en bandas amplias cruzando el área a ser tratada. Permita que la aspersión penetre el follaje denso. Repita como sea necesario.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contamine agua, alimentos o forrajes al almacenar o eliminar este producto. Elimine el recipiente y su basura de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales.

ALMACENAMIENTO: Guarde en una área fresca lejos de calor o llama abierta.

ELIMINACION DEL PLAGUICIDA: Los residuos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en un sitio o en instalaciones aprobadas para eliminación de plaguicidas.

ELIMINACION DEL RECIPIENTE: NO PERFORE O INCINERE!! El recipiente vacío después de usar el producto de acuerdo a las direcciones de uso de la etiqueta puede ofrecerlo para reciclado, si esta disponible. Si el reciclado no está disponible y si lo permiten las regulaciones locales, coloque el recipiente en la basura. Si el recipiente está parcialmente lleno, contacte su Agencia local de residuos sólidos o llame al 1-800-CLEANUP (1-800-253-2687) para las instrucciones de eliminación.

No contiene CFC's u otra sustancia que afecte el ozono. Las regulaciones federales prohíben el uso de propelentes a base de CFC en aerosoles.



A Prescription Treatment® brand Un Insecticide de:
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
www.wmmg.com

© 2005 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

NOTA: Esta muestra de etiqueta es solo para propósitos informativos. Para las instrucciones de uso, vea la etiqueta adherida al envase del producto o llame al telefono 800-777-8570 para mayor información. **Para la etiqueta automática de la espécimen actualiza, el registro en www.wmmg.com.**

070522-71